

A surveiller de près ...

Le Faux Indigo

Amorpha fruticosa L.



© F. Desmoulin CBNBP/MNHN

- **Origine** : Amérique du Nord
- **Floraison** : mai-septembre
- **Biologie** : arbuste (5-6m)
- **Mode de dispersion** : reproduction végétative (drageons)
- **Ecologie** : berges des cours d'eau, marais
- **Statut en Centre-Val de Loire** : espèce préoccupante susceptible d'intégrer la liste d'alerte

Localisation en région Centre-Val de Loire

Uniquement connue en 2020 dans le département de l'Indre-et-Loire aux abords de Loches et de Tours. Sa dispersion sexuée (par graines) n'est pas observée en Centre-Val de Loire.



3 critères d'identification



© F. Desmoulin CBNBP/MNHN

Feuilles composées (15-25 folioles), ovales à lancéolés, typiquement parsemées de points translucides visibles face au soleil



© F. Desmoulin CBNBP/MNHN

Inflorescences en épis allongés d'une vingtaine de centimètres, constitués d'une cinquantaine de fleurs violet-noirâtre



© F. Desmoulin CBNBP/MNHN

Gousses courtes, légèrement recourbées en faux et ponctuées de petites verrues saillantes

Ne pas confondre avec ...

... de jeunes pousses de **Robinier faux-acacia** (*Robinia pseudacacia* L.) aux feuilles très similaires mais dépourvues de ponctuations translucides et aux rameaux épineux. A l'état adulte les confusions sont impossibles car le Robinier est un arbre de grande taille aux inflorescences blanches.



Source : Wikipédia

Vous pensez avoir **déjà remarqué cette plante quelque part** ou vous pensez **connaître des endroits propices à son installation**? Contactez le CBNBP ou le Cen Centre-Val de Loire afin de faire remonter vos observations. N'hésitez pas à joindre des photos et/ou échantillons pour faire valider rapidement vos données ! Merci de votre contribution.

Contact CBNBP : florient.desmoulin@developpement-durable.gouv.fr
 Contact Cen Centre-Val de Loire : charline.teffaut@cen-centrevalde Loire.org



© Noir Papillon