

A surveiller de près ...

Le Noyer du Caucase

Pterocarya fraxinifolia (Poir.) Spach




© F. Desmoulin CBNBP/MNHN

- **Origine** : Caucase
- **Floraison** : avril-mai
- **Biologie** : arbre (20-25m)
- **Mode de dispersion** : reproduction végétative importante (drageons)
- **Ecologie** : forêt alluviales marécageuses
- **Statut en Centre-Val de Loire** : espèce sur liste d'alerte

Localisation en région Centre-Val de Loire

Une petite dizaine de localités connues en 2020 issues de plantations d'alignement ou de production. Les populations en bordure de cours d'eau sont à surveiller prioritairement : Arnon, Indre, Loing, Loiret.



3 critères d'identification




© F. Desmoulin CBNBP/MNHN

Feuilles composées à 21-31 folioles plus larges dans la 1/2 supérieure et faiblement atténuées



© F. Desmoulin CBNBP/MNHN

Petites noix entourées de 2 ailes semi-circulaires et groupées en épis de 40-50cm de long



© F. Desmoulin CBNBP/MNHN

Emission abondante de drageons surtout en milieu humide

Ne pas confondre avec ...

... le **Frêne élevé** (*Fraxinus excelsior* L.) aux folioles moins nombreuses et au bourgeon noir caractéristique

... le **Noyer noir** (*Juglans nigra* L.) aux folioles longuement atténuées et à gros fruits circulaires (4-6cm) et rugueux.



© Université de Liège



Source : Wikipédia

Vous pensez avoir **déjà remarqué cette plante quelque part** ou vous pensez **connaître des endroits propices à son installation**? Contactez le CBNBP ou le Cen Centre-Val de Loire afin de faire remonter vos observations. N'hésitez pas à joindre des photos et/ou échantillons pour faire valider rapidement vos données ! Merci de votre contribution.



© Noir Papillon

Contact CBNBP : florient.desmoulin@developpement-durable.gouv.fr
Contact Cen Centre-Val de Loire : charline.teffaut@cen-centrevalde Loire.org